

La pyrale du buis

Comment agir contre ce ravageur?

Chenille



Le ravageur.

La pyrale du buis est un ravageur originaire d'Asie arrivé en 2007 par le Rhin dans la région de Bâle. Il s'est depuis répandu en Suisse centrale et orientale. Tout autour du lac de Zurich, on a également constaté la présence de pyrales du buis. Les chenilles sont actives au printemps et commencent alors à se nourrir. Elles peuvent atteindre jusqu'à 5 cm de long. Les chenilles de la pyrale du buis sont jaunes à vert foncé, elles ont une tête noire et sont striées longitudinalement de bandes blanches et noires. Au bout de quatre semaines, les chenilles tissent leur cocon dont elles sortiront sous forme de papillon afin de pondre à nouveau.

Comment reconnaître les dégâts.

On remarque immédiatement notamment les morsures faites par les chenilles de la pyrale du buis. Leur énorme appétit peut décimer des cultures entières de buis. Les chenilles mangent aussi bien les feuilles que l'écorce encore verte des jeunes rameaux. On identifie également la présence des pyrales du buis aux toiles blanches (analogues à celles de l'araignée) qui envahissent les branches. Durant l'hiver, on peut voir les hibernarium des chenilles nichés dans ces toiles. Les œufs jaunâtres de la pyrale du buis se trouvent sur la surface inférieure des feuilles, on les reconnaît à un point noir marquant le centre de chaque œuf.

Attention: les buis attaqués par le *Cylindrocladium*, une maladie fongique, perdent également leurs feuilles peu à peu. Les points caractéristiques d'une attaque de pyrales du buis sont les fils de soie blancs et les traces de morsures bien visibles.

La lutte.

Le Kendo® permet une lutte efficace contre la pyrale du buis. Les plantes doivent être bien recouvertes avec la bouillie.

Papillon



Dégâts



Copyright: Andreas Vietmeier



Kendo®, 50 ml, pour le traitement des buis isolés.

Matière active: lambda-cyhalothrine.