Plan d'entretien - au cours de l'année

Baies, Fruits et Vigne

Mois	janv.	févr.	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Entretien	aucun		peu		moyen		fréquent					
Moment de traitement optimal	●	début,	●	milieu,	●	fin	ou	●●●●●●	mois entier			
Pulvérisation au débourrement		●										
Tour de taille (fruits).												
Paillage (baies)												
Tour de taille (fruits).												
Taille (baies)												
Fertilisation / compost (baies)												
Cheimatobies			●									
Tavelure (fruits à pépins)			●			●	●	● ●				
Désherbage												
Arrosage												
Moniliose (fruits à noyau)				●	●							
Moniliose (fruits à pépins)												
Érinose												
Pucerons												
Maladie criblée (fruits à noyau).												
Mouche du vinaigre					●	●						
Carpocampe des pommes					●	●						
Pourriture grise (fraisiers).												
Plantation												
Éliminer les feuilles mortes.												

Westland Schweiz GmbH
Rudolf-Maag-Strasse 5, 8157 Dielsdorf, Schweiz
Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), **www.maag-garden.ch**

21/02/2024

Plan d'entretien - Produits

Baies, Fruits et Vigne

Type	Infestation	Préparation (organique/conv.)		Délai d'att.	Méthode	Indications
	Fertilisation					
Divers	Carence générale en nutriments	**Carbo-Active** 50 ml/10 l	NOUVEA		Arrosage	le charbon retient les nutriments dans le sol, les protège du lessivage + contribue à la compensation du CO_2.
		Maag Universel 20 ml/10 l			Arrosage	du débourrement au début de la formation des rameaux fleuris
		Maag Fleurs 20 ml/10 l			Arrosage	à partir de la formation des rameaux fleuris
		Maag Vital 20 ml/10 l d'eau			Arrosage	en mélange avec les engrais liquides Maag, favorise l'absorption des éléments nutritifs (racines)
		Organic Complete 40 ml/10 l	NOUVEA		Arrosage	**inodore,** 100 % naturel, usage universel
	Situations de stress : carence en nutriments, plantation, taille, faible croissance	**Maag Vital** 20 ml/10 l d'eau			Pulvérisation	renforce les plantes, favorise l'absorption des nutriments par les feuilles
	Carence en fer, en cas de croissance rapide	**Sequestrene Rapid** 20 g/m²			Épandre	au niveau des racines, arroser
		Sequestrene Rapid 20 g/10 l			Arrosage	dissoudre, peut colorer en rouge/rose
	Bouturage, protection physique de la partie coupée contre les agents pathogènes	**Rhizo-Aktiv-Gel**	NOUVEA		Tremper	tremper la coupe des boutures dans le gel et planter les boutures dans le substrat / sol
	Ravageurs					
	Arbres fruitiers colonnaires / mini-arbustes à baies					
	Anthonomes du fraisier/du framboisier	**Kendo Spray**		21	Vaporisation	jusqu'à la floraison et après la récolte, framboises uniquement en plein air
	Ver des framboises	**Kendo Spray**		21	Vaporisation	jusqu'à la floraison et après la récolte
	Thrips	**Kendo Spray**		21	Vaporisation	jusqu'à la floraison et après la récolte
	Haute tige, verger, espalier					
	Pucerons	**SanoPlant Bio Concentré** 50 ml/10 l		21	Pulvérisation	
	Pucerons (pommier, poirier, cerisier)	**Maag Neem** 19-30 ml/10 l		21	Pulvérisation	dosage selon la culture, voir instructions

Westland Schweiz GmbH
Rudolf-Maag-Strasse 5, 8157 Dielsdorf, Schweiz
Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), **www.maag-garden.ch**

Plan d'entretien - Produits

Baies, Fruits et Vigne

Type	Infestation	Préparation (organique/conv.)	Délai d'att.	Méthode	Indications
Insecticides	Pucerons (fruitiers en général ou mûriers, fraisiers, myrtilles, espèces Ribes, framboisiers, mini-kiwi, sureau noir)	**Siva Natura** 125 ml ou 200 ml/10 l	7	Pulvérisation	dosage fruits 125 ml/10 l, bien mouiller de tous les côtés, répéter si nécessaire
	Pucerons (fruitiers en général)	**Siva Natura** 125 ml/10 l	7	Pulvérisation	
	Psylle du poirier (poires, nashis)	**Rondo Natura** 50 g/10 l		Pulvérisation	traiter après la floraison
	Phytopte du poirier, ériophyides gallicoles/libr	**Thiovit** 200 g/10 l		Pulvérisation	après la récolte
		Thiovit Liquid 200 ml/10 l		Pulvérisation	après la récolte
	Ériophyide des ronces	**Thiovit** 200 g/10 l		Pulvérisation	pulvérisation au débourrement, lors du gonflement des bourgeons
		Thiovit 100 g/10 l		Pulvérisation	à partir d'une longueur de pousse de 10-15 cm
		Thiovit Liquid 200 ml/10 l		Pulvérisation	pulvérisation au débourrement, lors du gonflement des bourgeons
		Thiovit liquide 100 ml/10 l		Pulvérisation	à partir d'une longueur de pousse de 10-15 cm
	Anthonomes du fraisier/du framboisier	**Perfetto HG** 40 ml/10 l	3	Pulvérisation	
		Kendo Gold 200 ml/10 l	21	Pulvérisation	framboisiers en plein air uniquement
	Tarsonèmes du fraisier	**Spomil K** 5 ml/2,5 l	21	Pulvérisation	avant et après floraison
	Cheimatobies	**SanoPlant Bio Concentré** 50 ml/10 l	21	Pulvérisation	utiliser avant et après la floraison, ne pas employer par temps froid
		Maag Dipel 5 g/10 l		Pulvérisation	
	Drosophiles du cerisier (baies, sureau noir)	**Perfetto HG** 40 ml/10 l	3	Pulvérisation	du début de la maturation des fruits jusqu'à peu avant la pleine maturité
	Acariose	**Thiovit Liquid** 200 ml/10 l		Pulvérisation	pulvérisation au débourrement, lors du gonflement des bourgeons
	Hyponomeutes	**Maag Dipel** 5 g/10 l		Pulvérisation	
	Ver des framboises	**Perfetto HG** 40 ml/10 l	3	Pulvérisation	
		Kendo Gold 200 ml/10 l	21	Pulvérisation	

Westland Schweiz GmbH
Rudolf-Maag-Strasse 5, 8157 Dielsdorf, Schweiz
Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), **www.maag-garden.ch**

Plan d'entretien - Produits

Baies, Fruits et Vigne

Type	Infestation	Préparation (organique/conv.)	Délai d'att.	Méthode	Indications
	Phytopte du groseillier	**SanoPlant Huile d'hiver** 200 ml/10 l		Pulvérisation	juste avant le débourrement
	Érinose (vigne)	**SanoPlant Huile d'hiver** 200 ml/10 l		Pulvérisation	après une infestation, pulvérisation au débourrement l'année suivante.
		Thiovit 40 g/10 l		Pulvérisation	2-3 fois à partir de l'infestation
		Thiovit Liquid 200 ml/10 l		Pulvérisation	pulvérisation au débourrement, lors du gonflement des bourgeons
	Ériophyide libre(fruits à pépins)	**Thiovit** 30-75 g/10 l		Pulvérisation	effet secondaire
		Thiovit Liquid 30-50 / 50-75 / 75 g/10 l		Pulvérisation	avant / après la floraison / au débourrement
		Maag Dipel 5 g/10 l		Pulvérisation	
	Limaces	**Limax Ferro** 5 g/m²		Épandre	épandre sur le sol
		Limax M 5 g/10 m²		Épandre	épandre sur le sol
	Acariens (fraisiers)	**Belrose Natura**	3	Pulvérisation	
	Acariens (fruits en général ou mûres, fraises, myrtilles, espèces Ribes, framboises, mini-kiwi, sureau noir)	**Siva Natura** 125 ml ou 200 ml/10 l	7	Pulvérisation	dosage fruits 125 ml/10 l, bien mouiller de tous les côtés, répéter si nécessaire
	Acariens (fruits à pépins/à noyau)	**Spomil K** 10 ml/2,5 l		Pulvérisation	dès la floraison
	Tordeuses de la grappe (vigne)	**Maag Dipel** 5 g/10 l		Pulvérisation	après la floraison
	Ravageurs hivernants	**SanoPlant Huile d'hiver** 200 ml/10 l		Pulvérisation	+ **Cupromaag Liquid** 30 ml/10 l, directement au gonflement des bourgeons.
	Maladies fongiques				
	Petites plantes isolées				
	Oïdium (vigne)	**Maag Fongicide Spray**		Vaporisation	
		Aerofleur Spray c. les maladies fongiques		Vaporisation	après la floraison, au plus tard à la mi-août
	Oïdium, maladie de la suie et tavelure (pommier)	**Maag Fongicide Spray**	21	Vaporisation	dès le débourrement
	Tavelure (fruits à pépins)	**Aerofleur Spray c. les maladies fongiques**	21	Vaporisation	à partir du débourrement jusqu'à fin juillet au plus tard
	Groupes de plantes, massifs				
	Chancre bactérien (cerisier)	**Belrose Cupro** 50-75 ml/10 l		Pulvérisation	à la chute des feuilles

Westland Schweiz GmbH
Rudolf-Maag-Strasse 5, 8157 Dielsdorf, Schweiz
Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), **www.maag-garden.ch**

Plan d'entretien - Produits

Baies, Fruits et Vigne

Type	Infestation	Préparation (organique/conv.)	Délai d'att.	Méthode	Indications
Fongicides	Pourriture amère (cerises)	**Hortosan** 10 ml/10 l	21	Pulvérisation	au plus tard jusqu'au développement des fruits, pas à proximité de pommiers
	Anthracnose (espèces Ribes)	**Belrose Cupro** 25-75 ml/10 l		Pulvérisation	avant floraison et après récolte
		Cupromaag Liquid 45-75 ml/10 l		Pulvérisation	avant floraison et après récolte
	Taches foliaires rouges, blanches, angulaires	**Belrose Cupro** 25-75 ml/10 l		Pulvérisation	avant floraison et après récolte
		Cupromaag Liquid 45-75 ml/10 l		Pulvérisation	avant floraison et après récolte
	Oïdium (fraisier)	**Thiovit** 30-75 g/10 l	14	Pulvérisation	pas de traitement de la floraison à la fin de la récolte
	Oïdium (fraises/espèces Ribes)	**Hortosan** 10 ml/10 l pour 100 m²	14 / 21	Pulvérisation	avant floraison et après récolte
	Oïdium (vigne)	**Rondo Natura** 20 g/10 l		Pulvérisation	avant / après la floraison jusqu'au plus tard mi-août
	Oïdium (mûres, fraises, baies de goji, framboises, fruits à pépins)	**Rondo Natura** 30 g/10 l	3	Pulvérisation	Délai d'attente pour les fruits à pépins 8 jours
	Oïdium (myrtilles, mini-kiwis, espèces Ribes)	**Rondo Natura** 40 g/10 l	3	Pulvérisation	
	Oïdium (fruits à pépins)	**Thiovit** 30-75 g/10 l		Pulvérisation	
		Thiovit Liquid 30-50 / 50-75 / 75 g/10 l		Pulvérisation	avant / après la floraison / au débourrement
	Oïdium (effet partiel, vigne)	**Cupromaag Liquid** 15 ml/10 l		Pulvérisation	après la floraison, au plus tard à la mi-août
	Mildiou (vigne)	**Belrose Cupro** 25 ml/10 l		Pulvérisation	au plus tard fin août
		Belrose Cupro 75 ml/10 l			traitement final au plus tard fin août, seulement en cas de forte infestation
		Cupromaag Liquid 30–45 ml/10 l		Pulvérisation	
		Cure pour les haies 20 ml/10 l NOUVEA		Pulvérisation	Traitement pré et postfloraison jusqu'à la mi-août au plus tard
	Pourriture grise (vigne)	**Cupromaag Liquid** 15 ml/10 l		Pulvérisation	après la floraison, au plus tard à la mi-août
	Cloque	**Belrose Cupro** 50–75 ml/10 l		Pulvérisation	au débourrement
		Cupromaag Liquid 30–45 ml/10 l		Pulvérisation	au débourrement
	Mildiou du fraisier	**Cure pour les haies** 50 ml/10 l NOUVEA		Arrosage	jusqu'à la floraison et après la récolte
		Cure pour les haies 50 ml/10 l NOUVEA	21	Pulvérisation	max. 3 applications par pulvérisation ou arrosage

Westland Schweiz GmbH
Rudolf-Maag-Strasse 5, 8157 Dielsdorf, Schweiz
Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), **www.maag-garden.ch**

Plan d'entretien - Produits

Baies, Fruits et Vigne

Type	Infestation	Préparation (organique/conv.)	Délai d'att.	Méthode	Indications
	Maladie des pochettes du prunier	**Belrose Cupro** 50-75 ml/10 l		Pulvérisation	au débourrement
	Colletotrichum (groseilles / groseilles à maqu	**Hortosan** 10 ml/10 l pour 100 m²	21	Pulvérisation	max. 3 applications, pas à proximité de pommiers
	Moniliose des fruits	**Rondo Natura** 20 g/10 l		Pulvérisation	au plus tard à partir du moment où les fruits se touchent
	Moniliose des fleurs et des rameaux (cerisier	**Rondo Natura** 20 g/10 l		Pulvérisation	pendant la floraison
	Moniliose des fleurs et des rameaux (abricotier, pêcher / nectarinier)	**Rondo Natura** 30 g/10 l		Pulvérisation	pendant la floraison
	Moniliose des fleurs et des rameaux (fruits à	**Hortosan** 10 ml/10 l	21	Pulvérisation	pendant la floraison, pas à proximité de pommiers
	Moniliose des fleurs et des rameaux (pêcher / nectarinier)	**Rondo Natura** 30 g/10 l		Pulvérisation	
	Rouille (pruneau/prune)	**Thiovit** 30-50 g/10 l	21	Pulvérisation	dès le débourrement
	Maladie des rameaux (framboisiers/mûriers)	**Belrose Cupro** 50-130 ml/10 l		Pulvérisation	
		Cupromaag Liquid 75-120 ml/10 l		Pulvérisation	10 l de bouillie pour 100 m²
		Hortosan 10 ml/10 l	21	Pulvérisation	pas à proximité des pommiers
	Tavelure, tavelure tardive (fruits à pépins)	**Rondo Natura** 30 g/10 l	8	Pulvérisation	en mélange en cuve avec **Thiovit**
		Cure pour les haies 20 ml/10 l NOUVEA	14	Pulvérisation	
	Maladie criblée (fruits à noyau)	**Belrose Cupro** 50-75 ml/10 l		Pulvérisation	au débourrement
		Cupromaag Liquid 30–45 ml/10 l		Pulvérisation	au débourrement
		Thiovit 30-75 g/10 l		Pulvérisation	avant et après la floraison, pas pour l'abricotier
		Thiovit Liquid 30-50 / 50-75 / 75 g/10 l		Pulvérisation	avant / après la floraison / au débourrement
		Hortosan 10 ml/10 l	21	Pulvérisation	pas à proximité des pommiers
	Excoriose (vigne)	**Thiovit** 200 g/10 l		Pulvérisation	pulvérisation au débourrement, lors du gonflement des bourgeons
	Maladies fongiques hivernantes	**Cupromaag Liquid** 30 ml/10 l		Pulvérisation	SanoPlant Huile d'hiver 200ml / 10 l +

Westland Schweiz GmbH
Rudolf-Maag-Strasse 5, 8157 Dielsdorf, Schweiz
Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), **www.maag-garden.ch**

Type	Infestation	Préparation (organique/conv.)	Délai d'att.	Méthode	Indications
	Mauvaises herbes et graminées				
Herbicides	Mauvaises herbes et graminées	**Deserpan Rasant**		Vaporisation	éventuellement répéter, éviter la dérive
		Deserpan DT 100 ml/10 l		Pulvérisation	à partir de 20 cm de hauteur, éviter la dérive
Div.	Mauvaises herbes en germination	**Barrière mauvaises herbes** 100-200 g/m²	NOUVEAU	Épandre	enfouir superficiellement + arroser, répéter après 4-6 semaines