Plan d'entretien - au cours de l'année

Rosiers

Mois	janv.	févr.	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Entretien	aucun		peu		moyen		fréquent					
Moment de traitement optimal	●	début,	●	milieu,	●	fin	ou	●●●●●●	mois entier			
Pulvérisation d'automne/d'hiver/au débourrage.												
Paillis												
Marcottage/bouturage												
Taille												
Fumure/compost												
Taches foliaires												
Arrosage												
Désherbage												
Ravageurs												
Plantation												
Nettoyage												
Éliminer les feuilles mortes.												
Protect. d'hiver/buttage												

Westland Schweiz GmbH
Rudolf-Maag-Strasse 5, 8157 Dielsdorf, Schweiz
Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), **www.maag-garden.ch**

21/02/2024

Plan d'entretien - Produits

Rosiers

Type	Infestation	Préparation (organique/conv.)		Méthode	Indications
	Fertilisation				
Divers	Carence générale en nutriments	**Carbo-Active** 50 ml/10 l	NOUVEA	Arrosage	le charbon retient les nutriments dans le sol, les protège du lessivage + contribue à la compensation du CO_2.
		Maag Universel 20 ml/10 l		Arrosage	du débourrement au début de la formation des rameaux fleuris
		Maag Fleurs 20 ml/10 l		Arrosage	de la formation des rameaux fleuris jusqu'à fin juillet
		Maag Vital 20 ml/10 l d'eau		Arrosage	en alternance / mélange avec Maag Universel / Fleur
		Organic Complete 40 ml/10 l	NOUVEA	Arrosage	**inodore,** 100 % naturel, utilisation universelle
	Situations de stress telles que carence en nutriments, bouturage, plantation, taille, croissance faible	**Maag Vital** 20 ml/10 l d'eau		Arrosage / Pulvérisation	en mélange avec les engrais liquides Maag, favorise l'absorption des éléments nutritifs via les racines et les feuilles
	Carence en fer, en cas de croissance rapide	**Sequestrene Rapid** 20 g/m²		Épandre	au niveau des racines, arroser
		Sequestrene Rapid 20 g/10 l		Arrosage	dissoudre, peut colorer en rouge/rose
	Substrat, substitut de terreau	**Seramis Granulé pour plantation Bio**		Rempotage	lors du rempotage, la terre est conservée au niveau de la motte, l'humidité est plus régulière, les arrosages sont moins fréquents.
	Évaluer correctement l'humidité de la motte	**Seramis Indicateur d'arrosage**		Piquer	l'affichage devient bleu après l'arrosage, arroser lorsqu'il passe au rouge, pour une humidité régulière dans l'espace racinaire
	Bouturage, protection physique de la partie coupée contre les agents pathogènes	**Rhizo-Aktiv-Gel**	NOUVEA	Tremper	tremper la coupe des boutures dans le gel et planter les boutures dans le substrat / sol
	Ravageurs				
	Plantes isolées				
	Pucerons, chrysomélidés, mineuses, chenilles mineuses, cochenilles, cochenilles lécanines, acariens, mouches blanches, poux farineux (cochenilles farineuses), cicadelles, cicadelles du rosier	**Aerofleur Natura Spray**		Vaporisation	utiliser de manière répétée
		Maag Stop-cochenilles spray		Vaporisation	utiliser de manière répétée

Westland Schweiz GmbH
Rudolf-Maag-Strasse 5, 8157 Dielsdorf, Schweiz
Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), **www.maag-garden.ch**

Plan d'entretien - Produits

Rosiers

Type	Infestation	Préparation (organique/conv.)	Méthode	Indications
Insecticides	Chrysomélidés, pucerons, mirides, vers gris, cécidomyies, thrips, sciarides, mouches blanches	**Kendo Spray**	Vaporisation	
	Pucerons, cochenilles, acariens, mouches blanches, poux farineux (cochenilles farineuses)	**SanoPlant Spray contre les ravageurs**	Vaporisation	utiliser de manière répétée
	Acariens	**Spomil Spray anti-acariens**	Vaporisation	appliquer de manière répétée, surtout sur la face inférieure des feuilles
	Groupes de plantes, massifs			
	Pulvérisation au débourrement	**SanoPlant Huile d'hiver**	Pulvérisation	contre les cochenilles lécanines, les pucerons, les acariens et les cheimatobies hivernants
	Otiorhynques adultes	**Maag Stop-coléoptère** 8–16 ml/l	Pulvérisation	rosiers en pot, traiter le soir, le coléoptère - actif la nuit
		Perfetto HG 8-16 ml/l	Pulvérisation	rosiers en pot, traiter le soir, le coléoptère est actif la nuit
	Pucerons	**Belrose contre les pucerons** 50 ml/10 l	Pulvérisation	effet spécifique uniquement sur les pucerons
		Belrose Natura 25 ml/l	Pulvérisation	tous les 4-7 jours, ne pas traiter les fleurs
	Mouches mineuses	**Maag Stop-coléoptère** 6–16 ml/1 l	Pulvérisation	
		Maag Neem 30 ml/10 l	Pulvérisation	répéter après 10 jours, pas sur les fleurs
		Perfetto HG 6-16 ml/1 l	Pulvérisation	
	Cochenilles	**Maag Neem** 30 ml/10 l	Pulvérisation	répéter après 10 jours, pas sur les fleurs
	Chenilles, chenilles chenilles phyllophages	**SanoPlant Bio Concentré** 50 ml/10 l	Pulvérisation	uniquement sous serre
		Maag Stop-coléoptère 6–8 ml/1 l	Pulvérisation	
		Perfetto HG 6-8 ml/1 l	Pulvérisation	
	Hyponomeutes, phalènes, lymantridés (orgyies)	**Maag Dipel** 10 g/10 l	Pulvérisation	le soir, appliquer sur les petites chenilles
		Maag Stop-coléoptère 6–8 ml/1 l	Pulvérisation	
		Perfetto HG 6-8 ml/1 l	Pulvérisation	
	Limaces	**Limax Ferro** 50 g/10 m²	Épandre	les limaces se cachent sans laisser de traces de bave
		Limax M 5 g/10 m²	Épandre	
	Acariens, araignées rouges	**Maag Neem** 30 ml/10 l	Pulvérisation	répéter après 10 jours, pas sur les fleurs
		Belrose Natura 25 ml/l	Pulvérisation	tous les 4-7 jours, ne pas traiter les fleurs

Westland Schweiz GmbH
Rudolf-Maag-Strasse 5, 8157 Dielsdorf, Schweiz
Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), **www.maag-garden.ch**

Plan d'entretien - Produits

Rosiers

Type	Infestation	Préparation (organique/conv.)		Méthode	Indications
		Spomil K 5 ml/5 l		Pulvérisation	traiter soigneusement la face inférieure des feuilles
	Thrips	**Perfetto HG** 6-8 ml/1 l		Pulvérisation	
		Maag Stop-coléoptère 6–8 ml/1 l		Pulvérisation	
		Maag Neem 30 ml/10 l		Pulvérisation	répéter après 10 jours, pas sur les fleurs
	Mouches blanches	**Maag Neem** 30 ml/10 l		Pulvérisation	répéter après 10 jours, pas sur les fleurs
	Maladies fongiques				
Fongicides	**Plantes isolées**				
	Oïdium, rouille, maladie des taches noires du	**Aerofleur Spray contre les maladies fongiques**		Vaporisation	préventivement tous les 10-14 jours.
	Oïdium	**Maag Fongicide Spray**		Vaporisation	utiliser de manière répétée
	Groupes de plantes, massifs				
	Pulvérisation d'automne, d'hiver ou audébourrement, nécrose corticale	**Belrose Cupro** 130 ml/10 l		Pulvérisation	à partir de 5 °C, pour les pulvérisations d'automne et d'hiver
		Belrose c. les maladies fongiq. 50 ml/10 l		Pulvérisation	traiter à partir de 10 C, mieux 15 °C, également à titre préventif contre les maladies des taches foliaires hivernantes
	Champignons des taches foliaires, maladie de	**Belrose c. les maladies fongiq.** 50 ml/10 l		Pulvérisation	lorsque les nouvelles pousses mesurent 10-20 cm.
		Belrose Cupro 20–100 ml/10 l		Pulvérisation	à partir de 5 °C, effet secondaire positif sur les bactérioses
	Oïdium	**Hortosan** 10 ml/10 l		Pulvérisation	répéter après 10 jours, pas à proximité des pommiers
		Thiovit 10 ml/10 l		Pulvérisation	effet secondaire positif sur les acariens
		Thiovit liquide 20 ml/10 l		Pulvérisation	effet secondaire positif sur les acariens
		Rondo Natura 30 g/10 l		Pulvérisation	tous les 7-10 jours / ne pas utiliser en cas de chaleur (> 25 °C)
	Mildiou	**Belrose Cupro** 20-60 ml/10 l		Pulvérisation	
		Cure pour les haies 50 ml/10 l	NOUVEA	Vaporisation	pénètre, protège de l'intérieur
	Pourriture grise	**Switch HG** 12 g/10 l		Pulvérisation	préventif et curatif
		Hortosan 10 ml/10 l		Pulvérisation	effet partiel

Westland Schweiz GmbH
Rudolf-Maag-Strasse 5, 8157 Dielsdorf, Schweiz
Helpline 0900 800 009 (50 Rp./Min.), **www.maag-garden.ch**

Plan d'entretien - Produits

Rosiers

Type	Infestation	Préparation (organique/conv.)	Méthode	Indications
	Nécrose corticale	**Belrose Cupro** 20 ml/10 l	Pulvérisation	en dehors de la période de pulvérisation automne / hiver
	Rouille	**Belrose c. les maladies fongiq.** 50 ml/10 l	Pulvérisation	répéter après 10 jours
		Hortosan 10 ml/10 l	Pulvérisation	répéter après 10 jours
	Plaies sur l'écorce et le bois	**Pâte cicatrisante**	Badigeonner	après la taille ou une chute de grêle
	Pourriture du collet, pythium, maladies dues à des champignons pathogènes du sol (effet partiel contre : B. cinerea, Chalara spp., Fusarium spp., Penicillium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp., etc.).	**Cure pour les haies** 50 ml/10 l NOUVEA	Arrosage	est absorbé par les racines, se répartit dans toute la plante
	Mauvaises herbes et graminées			
He	Mauvaises herbes et graminées	**Deserpan Rasant**	Vaporisation	éventuellement répéter, cache-herbicide, éviter la dérive
	Algues, lichens, mousses	**Osotex M** 100 ml/900 ml	Pulvérisation / Arrosage	laisser sécher pour une bonne efficacité, effet physique
Divers	NOUVEA	**Barrière mauvaises herbes** 100-200 g/m²	Épandre	enfouir superficiellement + arroser
	Mauvaises herbes en germination	**Seramis Granulés pour plantation pour les plantes de massif, de balcon et en pot** 20–30 l/m²	Épandage	une couche de paillage empêche la germination des mauvaises herbes et protège d'une trop forte évaporation