

Tipo	Causa del danno / Scopo	Prodotto (organic/convenzionale)	Metodo	Note
Concimazione				
Vari	Carenza generale di nutrienti	Carbo-Active 50 ml/10 l	NOVITÀ Annaffiare	Il carbone nel terreno trattiene i nutrienti, ne previene il dilavamento e contribuisce alla compensazione del CO ₂ .
		Maag Universale 20 ml/10 l	Annaffiare	Dal germogliamento a inizio formazione dei germogli fiorali
		Maag Fiori 20 ml/10 l	Annaffiare	Da inizio formazione dei germogli fiorali
		Maag Vital 20 ml/10 l	Annaffiare	In miscela con concimi liquidi Maag, favorisce l'assorbimento di nutritivi attraverso le radici
	Condizioni di stress da carenza di nutritivi, moltiplicazione di talee, messa a dimora, potatura, crescita stentata	Maag Vital 20 ml/10 l	Irrorare	Rinvigorisce le piante, favorisce l'assorbimento di nutritivi attraverso le foglie
	Carenza di ferro, con crescita rapida	Organic Complete 40 ml/10 l	NOVITÀ Annaffiare	Inodore, 100 % naturale, impiego universale
		Sequestrene Rapid 20 g/m ²	Spargere	In corrispondenza delle radici, annaffiare
		Sequestrene Rapid 20 g/10 l	Annaffiare	Sciogliere in acqua, può formare macchie rosse/rosa
	Terricci, substrati	Seramis Granulato da trapianto per piante da aiuola, balcone e contenitore	Mischiare	Per miscele di terriccio per fiori con 10-25 % di granulato da trapianto
		Seramis Substrato speciale per cactacee e succulente	Messa a dimora	Per vasi e contenitori, utilizzare l'indicatore di umidità Seramis
Umidità	Seramis Indicatore d'irrigazione (klein / gross)	Infilare	Controllo semplice dell'umidità nel vaso o contenitore	
Moltiplicazione di talee, protezione fisica della superficie di taglio dai patogeni	Rhizo-Aktiv-Gel	NOVITÀ Intingere	Intingere le talee nel gel e in seguito piantarle nel substrato o nel terreno	
Parassiti				
Singole piante piccole				
	Afidi, mosche bianche	SanoPlant Spray contro gli insetti nocivi	Spruzzare	Trattare ripetutamente
		Aerofleur Natura Spray	Spruzzare	2-3 applicazioni a distanza di 3-5 giorni
	Bruchi minatori	Aerofleur Natura Spray	Spruzzare	2-3 applicazioni a distanza di 3-5 giorni
	Cocciniglie comuni	SanoPlant Spray contro gli insetti nocivi	Spruzzare	2-3 applicazioni a distanza di 3-5 giorni
		Aerofleur Natura Spray	Spruzzare	2-3 applicazioni a distanza di 3-5 giorni
		Maag Coccinigliestop spray	Spruzzare	2-3 applicazioni a distanza di 3-5 giorni
	Limacce	Limax Ferro 5 g/m ²	Spargere	Piccoli mucchietti attorno alla pianta

Tipo	Causa del danno / Scopo	Prodotto (organic/convenzionale)	Metodo	Note	
Insetticidi	Acari	Limax M 5 g/10 m ² Maag Coccinigliestop spray Spomil K (W-7267-1) 10 ml/10 l Spomil Spray contro gli acari	Spargere Spruzzare Irrorare Spruzzare	Piccoli mucchietti attorno alla pianta Trattare ripetutamente 1 trattamento per particella e anno Trattare ripetutamente	
	Cocciniglie cotonose	Maag Coccinigliestop spray	Spruzzare	Trattare ripetutamente	
	Cicadelle, cicalina del rododendro	Aerofleur Natura Spray Maag Coccinigliestop spray	Spruzzare Spruzzare	2-3 applicazioni a distanza di 3-5 giorni Trattare ripetutamente	
	Gruppi di piante, siepi				
	Afidi, afide verde dell'abete rosso, afidi cinari	Belrose contro i pidocchi 50 ml/10 l Belrose Natura [contro i pidocchi] 25 ml/l Maag Neem 30 ml/10 l Siva Natura 200 ml/10 l	Irrorare Irrorare Irrorare Irrorare	Specifico contro gli afidi Dopo il tramonto, in serre chiuse Ripetere dopo 10 giorni, non irrorare i fiori Bagnare bene le piante, trattare ripetutamente, temperature non superiori a 25 °C	
	Oziorrinco	Perfetto HG 8-12 ml/1 l Maag Stop-coleotteri 8-12 ml/1 l	Irrorare Irrorare	Di sera, per combattere i coleotteri attivi di notte Di sera, per combattere i coleotteri attivi di notte	
	Mosche minatrici	Maag Neem 30 ml/10 l	Irrorare	Ripetere dopo 10 giorni, non irrorare i fiori	
	Bruchi	SanoPlant Bio Konzentrat 50 ml/10 l	Irrorare	Solo in serra	
	Tignole, geometridi, limantridi	Maag Dipel 10 g/10 l Maag Stop-coleotteri 6-8 ml/1 l Perfetto HG 6-8 ml/1 l	Irrorare Irrorare Irrorare	Irrorare i piccoli bruchi la sera Di sera, per combattere i coleotteri attivi di notte	
	Acari (ragnetti rossi), acaro del bambù	Maag Neem 30 ml/10 l Belrose Natura 25 ml/l Siva Natura 200 ml/10 l	Irrorare Irrorare Irrorare	Ripetere dopo 10 giorni, non irrorare i fiori Dopo il tramonto, in serre chiuse Bagnare bene le piante, trattare ripetutamente, temperature non superiori a 25 °C	
Tripidi	Spomil K 5 ml/5 l Perfetto HG 6-8 ml/1 l Maag Stop-coleotteri 6-8 ml/1 l	Irrorare Irrorare Irrorare	Bagnare bene la pagina inferiore delle foglie		
Mosche bianche	Maag Neem 30 ml/10 l Maag Neem 30 ml/10 l Siva Natura 200 ml/10 l	Irrorare Irrorare Irrorare	Ripetere dopo 10 giorni, non irrorare i fiori Ripetere dopo 10 giorni, non irrorare i fiori Bagnare bene le piante, trattare ripetutamente, temperature non superiori a 25 °C		

Tipo	Causa del danno / Scopo	Prodotto (organic/convenzionale)	Metodo	Note
	Cicadelle, cicalina del rododendro Parassiti svernanti	Aerofleur Gold Granulat 1,5 g/l di substrato Maag Neem 30 ml/10 l SanoPlant Olio invernale 200 ml/10 l	Spargere Irrorare Irrorare	Annaffiare, agisce per 2-3 settimane, solo per piante in vaso e contenitore Ripetere dopo 10 giorni, non irrorare i fiori Trattare al più tardi appena prima del rigonfiamento delle gemme
Malattie fungine				
Singole piante piccole				
	Disseccamento fogliare del bosso	Aerofleur Spray cont. gli malattie fungine	Spruzzare	A partire da 15 °C, si distribuisce localmente
	Oidio, ruggine	Aerofleur Spray cont. gli malattie fungine	Spruzzare	Trattare preventivamente ogni 10-14 giorni
	Oidio	SanoPlant Spray contro malattie fungine	Spruzzare	Trattare ripetutamente
Gruppi di piante, aiuole				
	Irrorazione al germogliamento, cancri rameali	Belrose Cupro 130 ml/10 l	Irrorare	A partire da 5 °C, per irrorazione autunnale e invernale
	Maculature fogliari, ticchiolatura	Belrose cont. malattie fungine 50 ml/10 l Belrose Cupro 20-100 ml/10 l	Irrorare Irrorare	Quando i nuovi getti sono lunghi 10-20 cm A partire da 5 °C, buon effetto secondario su batteriosi
	Disseccamento fogliare del bosso	Switch HG 10 g/10 l	Irrorare	Trattamento preventivo, da metà aprile a ottobre
	Oidio	Belrose cont. malattie fungine 50 ml/10 l Rondo Natura 30 g/10 l	Irrorare Irrorare	A partire da 15 °C, si distribuisce localmente Ripetere ogni 7-10 giorni, temperature non superiori a 25 °C
		Thiovit 10-20 ml/10 l	Irrorare	Temperature non superiori a 25 °C
		Thiovit Liquid 20 ml/10 l	Irrorare	Temperature non superiori a 25 °C
		Hortosan 10 ml/10 l	Irrorare	Rose, ripetere dopo 10 giorni, non in prossimità di meli
	Peronospora	Belrose Cupro 20-60 ml/10 l	Irrorare	
	Marciume grigio	Cura per siepi 50 ml/10 l Switch HG 12 g/10 l Hortosan 10 ml/10 l	Irrorare Irrorare Irrorare	Azione penetrante, protegge dall'interno Rose, ripetere dopo 10 giorni, non in prossimità di meli
	Disseccamento gemme abete argentato	Belrose Cupro 210 ml/10 l	Irrorare	
	Ruggine	Belrose cont. malattie fungine 50 ml/10 l Hortosan 10 ml/10 l	Irrorare Irrorare	Ripetere dopo 10 giorni Rose, ripetere dopo 10 giorni

Tipo	Causa del danno / Scopo	Prodotto (organic/convenzionale)	Metodo	Note
	Ferite su corteccia e parti legnose Marciume radicale, Phytium, malattie causate da funghi patogeni del suolo (effetto parziale contro: B. cinerea, Chalara spp., Fusarium spp., Penicillium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp., ecc.)	Pasta cicatrizzante Cura per siepi 50 ml/100 m ²	Spalmare Annaffiare	Dopo potatura o grandine Viene assorbito dalle radici, si distribuisce in tutta la pianta
Malerbe e graminacee				
Erbicidi	Malerbe e graminacee	Deserpan Rasant 1 l/10 m ² Deserpan DT 100 ml/10 l	Spruzzare Irrorare	Ev. ripetere, evitare la deriva Dai 20 cm di altezza, evitare la deriva
Vari		Barriera malerbe 100-200 g/m ² Seramis Granulato da trapianto per piante da aiuola, balcone e contenitore 5-10 cm Seramis Substrato speciale per cactacee e succulente 5-10 cm	NOVITÀ Spargere Coprire Coprire	Incorporare in superficie e annaffiare Per vasi e contenitori + Seramis Indicatore d'irrigazione Per vasi e contenitori + Seramis Indicatore d'irrigazione