


# Piano di trattamento - Calendario Aiuole rialzate (ortaggi e piante ornamentali)



Tipo	Causa del danno / Scopo	Prodotto (organic/convenzionale)	Periodo di	Metodo	Note
<b>Concimazione ortaggi e piante ornamentali</b>					
Vari	Carenza generale di nutrienti	<b>Carbo-Active</b> 50 ml/10 l	NOVITÀ	Annaffiare	Il carbone nel terreno trattiene i nutrienti, ne previene il dilavamento e contribuisce alla compensazione del CO <sub>2</sub> .
		<b>Maag Universale</b> 20 ml/10 l		Annaffiare	Dal germogliamento a inizio formazione dei germogli fiorali
		<b>Maag Fiori</b> 20 ml/10 l		Annaffiare	Dalla formazione dei fiori e dei frutti
		<b>Maag Vital</b> 20 ml/10 l		Annaffiare	In miscela con concimi liquidi Maag, favorisce l'assorbimento di nutrienti attraverso le radici
		<b>Organic Complete</b> 40 ml/10 l	NOVITÀ	Annaffiare	<b>Inodore</b> , 100 % naturale, impiego universale
	Condizioni di stress da carenza di nutrienti, messa a dimora, potatura, crescita stentata	<b>Maag Vital</b> 20 ml/10 l		Irrorare	Rinvigorisce le piante, favorisce l'assorbimento di nutrienti attraverso le foglie, anche in miscela con concimi liquidi Maag, la sera dopo il tramonto
	Carenza di ferro, con crescita rapida	<b>Sequestrene Rapid</b> 20 g/m <sup>2</sup> <b>Sequestrene Rapid</b> 20 g/10 l		Spargere Annaffiare	In corrispondenza delle radici, annaffiare Sciogliere in acqua, può formare macchie rosse/rosa
Terricci, substrati	<b>Seramis Granulato da trapianto per piante da aiuola, balcone e contenitore</b>		Aggiungere	Colture in aiuole rialzate, per aumentare la capacità di ritenzione idrica del substrato	
Umidità	<b>Seramis Indicatore d'irrigazione</b> (piccolo / grande)		Infilare	Controllo semplice dell'umidità nel vaso o contenitore	
<b>Parassiti (ortaggi)</b>					
<b>Singole piante in vaso/contenitore</b>					
	Afidi, acari, mosche bianche	<b>SanoPlant Spray contro gli insetti nocivi</b>	3/7	Spruzzare	(Periodo di attesa serra/pieno campo), ripetere

# Piano di trattamento - Prodotti

# Aiuole rialzate (ortaggi e piante ornamentali)

Tipo	Causa del danno / Scopo	Prodotto (organic/convenzionale)	Periodo di	Metodo	Note
Insetticidi	Afidi, altiche, vermi grigi, dorifore (solo patate), tignola delle crucifere, cecidomia del cavolo, mosche minatrici, mosca delle carote, bruchi, criocera dell'asparago, criocera dai dodici punti, tripidi, mosche bianche	<b>Kendo Spray</b> 0,5 l/10 m <sup>2</sup>	14	Spruzzare	
	Tignola del porro	<b>Kendo Spray</b> 0,5 l/10 m <sup>2</sup>	14	Spruzzare	
<b>Parassiti (piante ornamentali)</b>					
<b>Singole piante</b>					
Insetticidi	Crisomelidi	<b>Aerofleur Natura Spray</b>		Spruzzare	
		<b>Maag Coccinigliestop spray</b>		Spruzzare	
	Afidi, mosche bianche	<b>SanoPlant Spray contro gli insetti nocivi</b>		Spruzzare	Trattare ripetutamente
	Acari	<b>Aerofleur Natura Spray</b>		Spruzzare	Trattare ripetutamente
		<b>Maag Coccinigliestop spray</b>		Spruzzare	Trattare ripetutamente
		<b>Spomil Milben Spray</b>		Spruzzare	Trattare ripetutamente, solo piante ornamentali
<b>Malattie fungine (ortaggi)</b>					
<b>Singole piante in vaso/contenitore</b>					
Fungicidi	Alternariosi delle carote	<b>Aerofleur Spray cont. gli malattie fungine</b>	14	Spruzzare	
	Maculature fogliari (cavolo cinese, cavolo cap)	<b>Aerofleur Spray cont. gli malattie fungine</b>	14	Spruzzare	
	Oidio	<b>SanoPlant Spray contro malattie fungine</b>	3	Spruzzare	2-3 trattamenti a intervalli di 8 giorni
<b>Malattie fungine (piante ornamentali)</b>					
<b>Singole piante</b>					
Fungicidi	Oidio, ruggine, ticchiolatura	<b>Aerofleur Spray cont. gli malattie fungine</b>		Spruzzare	Trattare preventivamente ogni 10-14 giorni
	Oidio	<b>Maag Fungicida Spray</b>	3	Spruzzare	Trattare ripetutamente
	Peronospora	<b>Cura per siepi</b> 50 ml/10 l		Irrorare	Massimo 6 trattamenti
<b>Malerbe e graminacee (ortaggi e piante ornamentali)</b>					

## Piano di trattamento - Prodotti

## Aiuole rialzate (ortaggi e piante ornamentali)

Tipo	Causa del danno / Scopo	Prodotto (organic/convenzionale)	Periodo di	Metodo	Note
Erbicidi	Malerbe e graminacee annuali e perenni (colture a maggese, alchechengi, carciofi, melanzane, cicoria belga, cardone, cucurbitacee, peperoni, melone pepino, fagioli rampicanti, pomodori, rabarbaro, asparagi)	<b>Deserpan Rasant</b> 100 ml/m <sup>2</sup>		Spruzzare	Dopo la germinazione (emergenza) delle malerbe, tra le fila, utilizzare una campana per evitare la deriva, ripetere sulle infestanti rizomatose perenni dopo la ricrescita
	Malerbe e graminacee annuali e perenni (alberi e arbusti al di fuori della foresta, colture a maggese)	<b>Deserpan Rasant</b> 100 ml/m <sup>2</sup>		Spruzzare	Dopo la germinazione (emergenza) delle malerbe, tra le fila, utilizzare una campana per evitare la deriva, ripetere sulle infestanti rizomatose perenni dopo la ricrescita
Vari	Malerbe in germinazione Terricci, substrati	<b>Barriera malerbe</b> 100-200 g/m <sup>2</sup> <b>Seramis Granulato da trapianto per piante da aiuola, balcone e contenitore</b> 3-5 cm		Spargere Coprire	Incorporare in superficie e annaffiare Come pacciamatura, la privazione della luce impedisce la germinazione di malerbe e graminacee

NOVITÀ