

# Piano di trattamento - Calendario

# Tappeto erboso

Mese	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic	
<b>Trattamento</b>	nessuno		saltuario		abituale		frequente						
periodo ottimale	● inizio,		● metà,		● fine		oppure ●●●●● tutto il mese						
<b>Muffa delle nevi</b>	■		■		■		■					■ ●	
<b>Lotta al muschio</b>	■		■		■		■					■	
<b>Scarificazione</b>	■		■		■		■					■	
<b>Lotta alle malerbe</b>	■		■		■		■					■	
<b>Tosatura</b>	■		■		■		■					■	
<b>Irrigazione</b>	■		■		■		■					■	
<b>Rifacimento completo</b>	■		■		■		■					■	
<b>Concimazione</b>	■		■		■ ●		■					■	
<b>Malattie fungine</b>	■		■		■		■					■	

Tipo	Causa del danno / Scopo	Prodotto (organic/convenzionale)	Periodo di	Metodo	Note
<b>Concimazione / Riparazione del prato</b>					
Vari	Terreno poco vitale, crescita stentata, punti radi, erba ingiallita in seguito a carenza di sostanze nutritive	<b>GreenLawn</b> 35-70 g/m <sup>2</sup>		Spargere e bagnare a pioggia	Materie prime 100 % naturali, attiva i microrganismi nel terreno e può essere utilizzato tutto l'anno
	Crescita stentata, punti radi, erba ingiallita in seguito a carenze	<b>CompactLawn</b> 35 g/m <sup>2</sup>		Spargere	Rinforza l'erba e rivitalizza il prato in soli 3 giorni, ideale dalla primavera all'autunno, per un tappeto erboso rigoglioso tutto l'anno
	Concimazione + riduzione muschio e malerbe	<b>TripleCare</b> 35 g/m <sup>2</sup>		Spargere e bagnare a pioggia	Bagnare entro 48 ore in assenza di pioggia
	Erba chiara e ingiallita, concimazione sbilanciata verso l'azoto per una crescita vigorosa	<b>Carbo-Active</b> 50 ml/10 l	NOVITÀ	Annaffiare	Il carbone nel terreno trattiene i nutrienti, ne previene il dilavamento e contribuisce alla compensazione del CO <sub>2</sub> .
	Erba chiara e ingiallita, concimazione sbilanciata verso l'azoto e il potassio per una crescita vigorosa	<b>Organic Complete</b> 40 ml/10 l	NOVITÀ	Annaffiare	Inodore, 100 % naturale, impiego universale
	Erba chiara e ingiallita, concimazione sbilanciata verso l'azoto per una crescita vigorosa	<b>Maag Universale</b> 20 ml/10 l di acqua		Annaffiare	Concimazione mirata, da eseguire di sera con cielo coperto
	A partire da fine agosto, concimazione con sbilanciamento verso il potassio e il fosforo per rinforzo e maggiore resistenza in inverno	<b>Maag Fiore</b> 20 ml/10 l di acqua		Annaffiare	Concimazione mirata, da eseguire di sera con cielo coperto
	Maggiore resistenza, miscibile con concime Maag Universal / Blüten, accelera l'assorbimento di nutritivi minerali attraverso le radici e le foglie	<b>Maag Vital</b> 20 ml/10 l di acqua		Annaffiare / Irrorare	
Punti calvi e chiazze rade	<b>Patch Magic</b> strato di 3 mm, 1 kg per 10 punti calvi Ø 45 cm = circa 1,6 m <sup>2</sup>		Spargere	Dopo aver eliminato l'erba vecchia, mantenere umido, non deve asciugarsi completamente	

Tipo	Causa del danno / Scopo	Prodotto (organic/convenzionale)	Periodo di Metodo	Note
<b>Parassiti (tappeto erboso)</b>				
Biocidi	Formiche	<b>Matil Formichestop</b> 20 g/nido	Spargere	Anche da annaffiare e irrorare sui percorsi abituali e sui nidi
		<b>Matil G</b> 50 g/10 l	Annaffiare	2 l di miscela/nido
Insetticidi	Larve di tipula	<b>Kendo Gold</b> 4 ml/m <sup>2</sup>	Irrorare	
<b>Malattie fungine (tappeto erboso)</b>				
Fungicidi	Antracnosi, maculature fogliari in genere, oidio, funghi patogeni del suolo, marciume radicale da Pythium, rizzotonia, ruggine, filo rosso, muffa delle nevi, mal del piede, fusariosi, cerchi delle streghe (effetto parziale)	<b>Hortosan</b> 10 ml/10 l per 100 m <sup>2</sup>	Irrorare	Dopo il primo sfalcio di nuovi impianti o su vecchi tappeti erbosi colpiti da malattie; max. 4 volte. Non in prossimità di meli!
	Antracnosi, maculature fogliari in genere, oidio, funghi patogeni del suolo, marciume radicale da Pythium, rizzotonia, ruggine, filo rosso, muffa delle nevi, mal del piede, fusariosi, cerchi delle streghe (effetto parziale)	<b>Fungicida per prato</b> 10 ml/10 l per 100 m <sup>2</sup>	Irrorare	Dopo il primo sfalcio di nuovi impianti o su vecchi tappeti erbosi colpiti da malattie; max. 4 volte Non in prossimità di meli!
	Muffa delle nevi, marciume grigio	<b>Switch HG</b> 15 g/10 l (15 l di miscela/100 m <sup>2</sup> )	Irrorare	Con almeno 15 °C e tempo asciutto
<b>Trattamento contro le malerbe</b>				
Erbicidi	Treatmento su tutta la superficie	<b>Erpax Quattro</b> 75 ml in 3,5 l di acqua/100 m <sup>2</sup>	Irrorare	Con 15-25 °C, su erba asciutta in crescita e con sufficiente superficie fogliare delle malerbe
		<b>Erpax Quattro</b> 75 ml in 35 l di acqua/100 m <sup>2</sup>	Annaffiare	

# Piano di trattamento - Prodotti

# Tappeto erboso

Tipo	Causa del danno / Scopo	Prodotto (organic/convenzionale)	Periodo di	Metodo	Note
Erbicidi	Trattamento di singole piante	<b>Erpax Spray</b> 100-150 ml/m <sup>2</sup>		Spruzzare	Con 15–25 °C, su erba asciutta in crescita
Vari	Muschio, epatiche	<b>Osotex M</b> 1 l/9 l di acqua = 10 l di miscela		Irrorare	Aprile-maggio o settembre-ottobre, bagnare a fondo il muschio
	Concimazione + riduzione muschio e malerbe	<b>TripleCare</b> 35 g/m <sup>2</sup>		Spargere e bagnare a pioggia	Bagnare entro 48 ore in assenza di pioggia
Erbicidi	Malerbe in germinazione	<b>Barriera malerbe</b> 100-200 g/m <sup>2</sup>		Spargere	Applicazione alla fioritura della forsizia/dei narcisi, ripetere in primavera / autunno
	Malerbe tenaci come specie di cardi, margherite, specie di ranuncoli, tarassaco, piantaggine lanciata, convolvoli	<b>Volpan</b>	2	Schiumare	Distribuire sulle foglie delle malerbe
Vari	Alghe e licheni su lastricati, vialetti, balconi e terrazze	<b>Osotex M</b> 1 l/9 l di acqua = 10 l di miscela		Irrorare	Efficacia ottimale da 5 a 28 °C
<b>Risanamento del tappeto erboso</b>					
Erbicidi	Rifacimento completo di superfici erbose	<b>Deserpan Rasant</b> 100 ml/m <sup>2</sup>		Spruzzare	Bagnare a fondo, trattare 2 volte le infestanti rizomatose a distanza di 1-2 settimane. Risemina possibile dopo 5 giorni.